



*Rosa Pomponia.*

*P. J. Redouté pinx.*

*Rosier Pompon.*

*Supermarché de Rouen.*

*Langlois sculp.*

ROSA POMPONIA.

*R. Germinibus subovatis, pedunculis petiolisque glanduloso-hispidis; caule aculeis subrectis; foliis ovatis, rugosis, subtus pubescentibus; floribus gemellis. (N.)*

*R. Pomponia.* D. C. Fl. franç. p. 3707.

*R. Provincialis.* Ait. Kew. vol. 2, pag. 204.

*R. (Gallica. Var. c.)* POIRET, Encyc. 6, p. 278.

*R. (Burgundica) germinibus subglobosis pedunculisque hispida, foliis ovatis subtus pubescentibus. Corolla parva, plena, incarnato-albida, disco obscuriore. PERS. Syn. 18.*

*R. (Centifolia) pomponia.* Bot. cultiv. Nouv. édit. 21. Var. 10. NOUY. DUHAM. Vol. 7, p. 37.

*An parvifolia?* WULF. spec. 2, pag. 1078. ENRI. Boiss. 6, p. 97.

LE ROSIER POMPON.

DESCRIPTION.

Les tiges du Rosier Pompon forment des buissons rameux qui s'élèvent peu: elles sont armées d'aiguillons épars, grêles, presque droits. Les feuilles sont composées de cinq folioles, ovales, ridées, d'un vert clair, tomenteuses en-dessous, simplement dentées, un peu ciliées, glanduleuses en leur bord, et portées par des pétioles velus. Les feuilles supérieures n'ont que trois folioles. Les fleurs, d'une odeur suave, le plus souvent disposées deux à deux à l'extrémité des ramuscules, sont supportées par des pédoncules hispides couverts, ainsi que l'ovaire et les lobes pinnatifides du calice, de glandes noires pédicellées, un peu visqueuses. La corolle très-double, se compose d'un